

چھاتی کے بعد سرویکل کینسر ہانگ کانگ کی عورتوں میں ہونے والا عام کینسر ہے۔ بچے دانی (وومب- اعضا جو بچے کو اندر رکھتی ہے) اور بیضہ دانی



- ہیومین پیپی لوما وائرس سے انفیکشن
- چھوٹی عمر میں شادی یا مرد سے ملاپ
- ایک سے زیادہ سے جنسی تعلقات
- سگریٹ نوشی
- قوت معذافت میں کمی

خطرے کے عوامل

- باقاعدگی سے ملاپ کے دوران کنڈوم کا استعمال کریں
- ایک ہی جنسی ساتھی تک محدود رہیں
- سگریٹ نوشی سے بچیں
- ایک صحت مند طرز زندگی اپنانے

حفاظتی تدابیر

Safe Sex. No Regrets.


- بچے دانی کے منہ کا ٹیسٹ ایک سادہ ٹیسٹ ہے، جو بچے دانی کے منہ کے سیلز میں غیر معمولی تبدیلیوں کا پتہ لگاتا ہے
- یہ ایک جلدی، بغیر درد کے، سستی اور آسان پہنچ ہے۔
- ابتدائی غیر معمولی تبدیلیوں کا جلدی پتہ لگانا
- بچے دانی کا کینسر بننے اور صحت مند نتیجہ حاصل کرنے کے لئے جلدی علاج کیا جا سکتا ہے۔

سرویکل

اسکریننگ -

سرویکل

سمیر



- عورتیں جن کی عمر 25 سے 64 سال ہے، جو جنسی ملاپ کا تجربہ رکھتی ہیں۔
- عورتوں کو بچے دانی کا ٹیسٹ مسلسل دو سال کروانا چاہیے، اگر دونوں رزلٹ نارمل ہوں، تو 65 سال کی عمر تک ہر تین سال بعد کروائیں

کس کو اور کتنی بار بچے دانی کا ٹیسٹ کروانا چاہیے؟

- آپ بچے دانی کے ٹیسٹ کے لئے اپنے فیملی ڈاکٹر، جنرل ڈاکٹر۔ گاننی کالوجسٹ، (NGOs) غیر سرکاری تنظیم اور گورنمنٹ کے صحت کے ادارے، زچگی اور بچوں کے صحت کے مراکز سے بھی کروا سکتے ہیں۔
- گچھ عورتیں جو HPV ویکسین لے چکی ہیں۔ ان کو مکمل تحفظ کے لئے پھر بھی باقاعدگی سے بچے دانی کا ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے۔

